

Будь ласка, уважно прочитайте інформацію з використання!

Краплі очні зволожуючі ОФТОЛІК УЛЬТРА, стерильні Інструкція із застосування

— — **Форма випуску медичного виробу.** Краплі очні без консервантів, розчин — —

Загальні відомості.

Склад:

натрію гіалуронат 0,4% (м / о), TS-полісахарид 0,2% (м / о), манітол, цитрат натрію, лимонна кислота, вода для ін'єкцій.

Характеристика:

Офтолік Ультра - стерильні очні краплі, без консервантів, що містять гіалуронат натрію та TS-полісахарид. Тривалий зволожуючий ефект, який сприяє усуненню дискомфорту, викликаного сухістю очей.

Натрію гіалуронат - речовина, яка завдяки своїм зволожуючим властивостям і в'язкості розчину, сприяє зволожуючому ефекту та нормалізації стану очної плівки.

TS-полісахарид - це натуральна речовина, отримана з насіння рослини Тамаринд індійський, яка є ефективною в запобіганні роговково-кон'юнктивального ксерозу.

TS-полісахарид створює захисну плівку на поверхні ока, яка сприяє відновленню фізіологічного балансу очної плівки та поверхні ока.

Комбінація двох цих речовин в складі одного препарату забезпечує синергічну дію на поверхні епітелію рогівки та кон'юнктиви, що перешкоджає подразненню, викликаному дією факторів навколишнього середовища (вітер, сонце, дим, сухе повітря), дією стресу (приміщення із зайвим освітленням або тривале використання комп'ютера) або механічних факторів (носіння контактних лінз, стан після проведення офтальмологічної операції).

Розчин має таку концентрацію, що забезпечує зволоження слизової оболонки ока у випадках відчуття вираженого дискомфорту.

Застосування

Офтолік Балас - стерильний офтальмологічний зволожуючий розчин, без консервантів, що містить захисні речовини: високомолекулярний натрію гіалуронат, який отримують шляхом біотехнологічного процесу, та TS-полісахарид з мукоадгезивною дією, що зволожують та нормалізують стан слизової оболонки ока.

Показання до застосування: Застосовується для зменшення відчуття сухості очей, **включаючи тяжкий стан.**

Спосіб застосування: по 1 краплі в кон'юнктивальний мішок ураженого ока один або декілька разів на день, в залежності від ступеня прояву симптомів.



Особливі вказівки та запобіжні заходи:

- не використовуйте розчин, якщо флакон пошкоджений;
- препарат призначений тільки для зовнішнього застосування в офтальмології;
- не використовувати при чутливості до певних компонентів медичного виробу;
- не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на флаконі;
- не можна торкатися носиком флакона до слизистих оболонок ока;
- при застосуванні очних крапель можлива тимчасова нечіткість зору через велику в'язкість розчину;
- рекомендується почекати декілька хвилин після застосування препарату перед початком здійснення дії, яка вимагає чіткості зору;
- рекомендується почекати 10-15 хвилин перед застосуванням іншого препарату для лікування захворювань ока;
- термін придатності після відкриття флакона - до 90 днів;
- після кожного застосування ретельно закривайте кришку флакона, переконайтеся, що на поверхні носика флакона не має крапель; при їх наявності - струсіть флакон різким рухом руки;
- зберігати в недоступному для дітей місці;
- зберігати при температурі не вище 25 ° C;
- не використовуйте всередину;
- щоб уникнути перетискання флакону не рекомендується закрапувати більше 30 крапель поспіль.

Упаковка: по 10 мл у багатодозовому флаконі разом з інструкцією поміщається всередину картонної коробки

Термін придатності:

2 роки.

Термін придатності препарату після першого відкриття оригінальної упаковки – до 90 діб.

Зберігання:

Зберігати в недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °C в оригінальній упаковці. Препарат не можна використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

Виробник: Фарміджеа С.п.А., Виа Дж. Б. Олива, 6/8, 56121, Піза, Італія.

Уповноважений представник виробника в Україні:

Представництво «Сентісс Фарма Прайвет Лімітед», 03040, Україна, м. Київ, Голосіївський р-н, вул. Васильківська, будинок 14, корпус Б, офіс 316
Тел. +38050 388 62 81, e-mail: dl-ukraine-office@sentisspharma.com



Відходи і ємності утилізувати належним чином.

Дата останнього перегляду інструкції із застосування: квітень 2019 року.



CE 0546

